

Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen sowie teilnehmende Studienzentren finden Sie auf der Internetseite www.clinlife.de/BI-connex oder scannen Sie einfach den folgenden QR-Code:



Boehringer Ingelheim ist Sponsor dieser klinischen Studie

1346-0011 / 1346-0013

Eine neue Chance für Menschen mit Schizophrenie?

Eine Studie zur Untersuchung einer **neuen Behandlungsoption**, für eine mögliche Verbesserung der Fähigkeiten im Alltag, die das **Denken und die Wahrnehmung** betrifft.



Wenn Sie selbst an **Schizophrenie** leiden, wissen Sie, wie sehr diese Erkrankung Ihre **Lebensqualität** beeinträchtigen kann.

Vielleicht kennen Sie aber auch jemanden, der an Schizophrenie leidet und verstehen, wie belastend dies für Betroffene ist.

Insbesondere Symptome die die **Kognition**, also das Denken und die Wahrnehmung, betreffen, können im Alltag sehr einschränkend sein. Dazu gehören beispielsweise:

- sich daran zu erinnern, wo Sie etwas hingelegt haben
- ein Buch zu lesen oder einen Film aufmerksam zu verfolgen
- Ihre Wegstrecke so zu planen, dass Sie pünktlich ankommen

Eine klinische Studie untersucht ein neues Studienmedikament, um herauszufinden, ob es Menschen mit Schizophrenie helfen kann.

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine Teilnahme:

- Alter zwischen 18-50 Jahren
- bestätigte Diagnose einer Schizophrenie
- stabile Dosis einer antipsychotischen Medikation seit min. 3 Monaten
- keine Einnahme von Clozapin
- kein suizidales Verhalten, d.h. Gedanken oder Versuche sich das Leben zu nehmen, innerhalb der letzten 3 Monate
- Studienpartner*in der/die min. eine Stunde in der Woche mit Ihnen in Kontakt steht

Für eine Studienteilnahme müssen weitere Kriterien in einem persönlichen Gespräch mit einer Studienärztin/einem Studienarzt abgeklärt werden.

Solange neue Studienmedikamente in klinischen Studien überprüft werden, ist nicht sicher, dass sie die erhoffte Wirkung haben.

Mögliche Nebenwirkungen wird Ihre Studienärztin/Ihr Studienarzt vor Teilnahme mit Ihnen besprechen. **Ihre Gesundheit und Sicherheit werden während einer klinischen Studie sorgfältig überwacht.**

Eine Studienteilnahme kann zu jeder Zeit, ohne Angaben von Gründen, beendet werden.

