

Checkliste zur Erfassung einer möglichen erblichen Belastung für Brust- und/oder Eierstockkrebs

Name der Patientin: _____

Geburtsdatum: _____

A. Patient/in und deren Geschwister / Kinder

Auftreten	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mamma-Karzinoms bei der Patientin vor dem 36. LJ		3	0
eines unilateralen Mamma-Karzinoms bei der Patientin vor dem 51. LJ		2	0
eines bilateralen Mamma-Karzinoms bei der Patientin, das erste vor dem 51. LJ		3	0
eines uni- oder bilateralen Mamma-Karzinoms bei der Patientin nach dem 50. LJ		1	0
eines Ovarial-/Tubenkarzinoms oder einer primären Peritonealkarzinose bei der Patientin		2	0
eines uni- oder bilateralen Mamma-Karzinoms bei dem Patienten (mnl.)		2	0
eines Mamma-Karzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten vor dem 36. LJ		3	0
eines unilateralen Mamma-Karzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten vor dem 51. LJ		2	0
eines bilateralen Mamma-Karzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten, das erste vor dem 51. LJ		3	0
eines uni- oder bilateralen Mamma-Karzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten nach dem 50. LJ		1	0
eines Mamma-Karzinoms bei Brüdern/Söhnen/Neffen		2	0
eines Ovarial-/Tubenkarzinoms o. einer primären Peritonealkarzinose bei Schwestern/Töchtern/Nichten		2	0
Summe Patient/in und deren Geschwister / Kinder		A	0

B. weitere mütterliche Linie

Auftreten	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen vor dem 36. LJ		3	0
eines unilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen vor dem 51. LJ		2	0
eines bilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen, das erste vor dem 51. LJ		3	0
eines uni- oder bilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen nach dem 50. LJ		1	0
eines Mamma-Karzinoms bei einem angehörigen Mann		2	0
eines Ovarial-/Tubenkarzinoms oder einer primären Peritonealkarzinose bei einer Angehörigen		2	0
Summe weitere mütterliche Linie		B	0

C. weitere väterliche Linie

Auftreten	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen vor dem 36. LJ		3	0
eines unilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen vor dem 51. LJ		2	0
eines bilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen, das erste vor dem 51. LJ		3	0
eines uni- oder bilateralen Mamma-Karzinoms bei einer Angehörigen nach dem 50. LJ		1	0
eines Mamma-Karzinoms bei einem angehörigen Mann		2	0
eines Ovarial-/Tubenkarzinoms oder einer primären Peritonealkarzinose bei einer Angehörigen		2	0
Summe väterliche Linie		C	0

D. Der höhere Wert aus B und C

D 0

E. Summe aus A und D = Risiko-Score

A+D 0

Ausfüllhinweis

Zunächst wird die Anzahl bekannter Erkrankungsfälle bei den Geschwistern und Kindern, einschließlich der aktuellen Erkrankung der Patientin sowie in der mütterlichen und väterlichen Linie erfragt.

Diese Zahlen werden mit den jeweiligen Gewichtungen multipliziert. Dann wird die Summe aus diesen Ergebnissen errechnet und in die Felder A und B und C eingetragen.

Der höhere der beiden Werte aus den Feldern B und C wird in Feld D eingetragen.

Der Gesamtscore errechnet sich dann aus der Summe der Felder A und D.

Eine Risikoberatung in den ausgewiesenen Zentren ist bei Scores ≥ 3 Punkten zu empfehlen.

Version: 30. März 2016 (C)
Ärztammer Westfalen-Lippe,
Deutsche Krebsgesellschaft,
Deutsche Gesellschaft für Senologie,
Deutsches Konsortium für Erblichen Brust- und Eierstockkrebs